

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

Canuel

Tamaño: Pequeño o medio.

Forma: Maliforme, más ancha que alta. Ligeramente asimétrica. Contorno muy irregular.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha, superficial o poco profunda. Borde ondulado. **Pedúnculo:** Muy largo, fino. Ruginoso. Implantado derecho.

Cavidad del ojo: Anchura y profundidad variables. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. **Ojo:** Grande, abierto, forma irregular. Sépalos anchos, cóncavos y erectos, muy separados entre sí, generalmente partidos casi en la base.

Piel: Totalmente ruginosa, basta y seca. **Color:** Verde oliváceo apagado o castaño rojizo. Punteado muy grueso, también ruginoso, muy visible por ser más rudo y de color más claro que el resto del fruto.

Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto corto de anchura media. Zona alrededor del tubo completamente petrificada.

Corazón: Tamaño medio, redondeado. Muy pedregoso, piedras de gran tamaño. Eje ancho y corto, abierto, lanoso. Celdillas elípticas, bastante alejadas del eje.

Semillas: Grandes. Semi-globosas, anchas y puntiagudas. Cara interna plana. Espolón bien marcado, acuminado. Color castaño rojizo con salientes casi negros.

Carne: Amarillenta, granulosa.

Maduración: Invierno.

